



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB)
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA**

Área: Clínica e Cirurgia dos Animais Silvestres

1) E

2) FFVFFV

3) a) Serpentes não possuem pálpebras, por isso, o estímulo vagal com pressão sobre os olhos não é realizado porque pode causar lesões oftálmicas.

b) No caso do estímulo vagal, a pressão no globo ocular ativa o décimo par de nervo craniano e, conseqüentemente, o sistema nervoso autônomo parassimpático, o que promove bradicardia, hipotensão e bradipneia.

c) No caso de pequenos cervídeos, esses apresentam baixa periculosidade para a equipe de manejo, entretanto, eles têm predisposição em desenvolver miopia por captura, por isso, em situações com manipulação prolongada e/ou com potencial de causar estresse intenso, é indicada a contenção química dos exemplares.

4) B

5) C

6) Antímero esquerdo porque o ovário e o oviduto direitos são atrofiados ou ausentes nas aves. A resposta também deveria incluir a descrição da ação do hormônio mulleriano nessa característica.

7) D

8) Osso peniano

9) A resposta teria que envolver fármacos que possuem antagonistas, como alfa-2 agonistas, benzodiazepínicos, opioides e bloqueadores neuromusculares. A partir do protocolo citado, seria avaliada a citação dos respectivos reversores, as doses e via propostas.

10) a) Eritrócitos, leucócitos (azurófilos, heterófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos, linfócitos) e trombócitos

b) Eritrócitos, leucócitos (heterófilos/neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos, linfócitos) e plaquetas

c) - Eritrócitos, leucócitos (heterófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos, linfócitos) e trombócitos

11) O leucograma de estresse em mamíferos é representado principalmente pelo padrão de leucocitose com neutrofilia, linfopenia, monocitose e eosinopenia. No caso das aves, a presença de estresse geralmente aumenta a relação entre heterófilo/linfócito.

12) A síndrome vagal é caracterizada pela presença de hipotensão, tonturas, escurecimento da visão, bradicardia, cólicas abdominais e diarreia.

13) De acordo com a Resolução 498/2018 CONAMA: “*criação amadorista de passeriformes da fauna silvestre: atividade de manutenção em cativeiro, sem finalidade econômica ou comercial, de indivíduo das espécies de aves nativas da Ordem Passeriformes, objeto de regulamentação específica;*”

14) D

15) A principal diferença entre as exigências e normas para criadouro conservacionista e mantenedouro é que no caso desse último tipo de estabelecimento, a reprodução de exemplares é proibida.

16) a) Fratura transversa simples em diáfise distal de tibiotarso esquerdo
b) Fixador externo tipo 1A

17) Um dos métodos mais utilizados para o diagnóstico de clamidiose em aves é a colheita de fezes para análise em reação de cadeia de polimerase (PCR). A resposta deveria incluir as orientações de colheita em relação ao melhor horário e à necessidade de obtenção de amostras seriadas. Além disso, no caso de conjuntivite, também poderia ser obtida amostra de secreção ocular para PCR.

18) A resposta deveria abordar a forma inativa do microrganismo, em meio extracelular (corpo elementar) e após sofrer apoptose, com interiorização na célula e ativação em corpo reticular e forma ativa. Também deveria ser descrito que a ação dos fármacos ocorre com eficiência apenas nos corpos reticulares intracelulares.

19) Apesar de se tratar de uma zoonose, quadros graves de psitacose são observados em pessoas imunossuprimidas e dificilmente há apresentação clínica em pessoas saudáveis. A resposta deveria abordar a forma mais comum de contaminação humana, por inalação de partículas em fezes secas, bem como os cuidados no manejo da ave para reduzir a chance de contaminação zoonótica. No caso do tratamento, esse é realizado com tetraciclina e deveria ser citado um fármaco com protocolo contendo dose, via, frequência e duração.

20) B

21) D

22) E

23) A resposta seria avaliada em relação à capacidade de interpretação e avaliação clínica do(a) candidato(a). Por exemplo, caso a lesão na asa seja a causa primária das manifestações clínicas, uma das suspeitas seria tiro de chumbinho, com intoxicação o que explicaria o quadro neurológico.

24) a) A resposta deveria incluir como base principal o oferecimento de volumoso e em menor quantidade o concentrado com citação de exemplos.
b) De acordo com o citado no item a, a resposta deveria incluir a citação de itens e a justificativa da escolha de cada um.

25) Independente da espécie a ser manejada, o planejamento é essencial para a execução com sucesso. A fase de planejamento é realizada dias ou até mesmo semanas antes do procedimento e incluir: levantamento e separação de materiais e equipamentos; divisão de tarefas da equipe; revisão e discussão de protocolos, ordem de execução e responsáveis por cada fase; previsão de possíveis complicações e respostas.

26) D

27) E